

Silmäluomileikkaus

Yläluomien blepharoplastia on yksi yleisimmistä plastiikkakirurgisista toimenpiteistä. Blepharoplastiassa poistetaan yläluomen ylimääräinen ihopoimu, joka on muodostunut ikääntymisen ja kulmakarvojen laskeutumisen seurauksena. Jos ihoylimäärä on vähäinen, on kyseessä yksityisesti tehtävä esteettinen toimenpide. Vanhemmalla iällä silmän eteen laskeutuvan ihopoimun poisto luokitellaan sairauden hoidoksi.

Blepharoplastia-arpi sijoitetaan yläluomen uurteeseen piiloon jäävään alueeseen. Yleensä arpi hukkuu ihoon siten, ettei se ole tavallisessa elämässä havaittavissa. Yläluomileikkauksella näkökenttä avartuu ja ilme muuttuu pirteämmäksi.

Tilanteen mukaan yläluomileikkaukseen voidaan liittää muita toimenpiteitä. Jos pullottava rasva tekee luomesta raskaan, voidaan rasvaa poistaa. Jos taas silmän avautuminen on puutteellista levatorlihaksen toiminnanvajeen vuoksi, voidaan tilannetta korjata yläluomileikkauksen yhteydessä.

Yläluomileikkauksessa voidaan käyttää veitseä, radiofrekvenssilaitetta tai laseria. Lopputulokseen käytetyllä leikkausmenetelmällä ei ole vaikutusta.